

הדרך פרטנית לאחר צנטור טיפול

כתיבת ועריכה: שרה בן צבי, N.Ed, R.M.

עודכן 2022

הבהרה: ההנחהיות כתובות בגוף שני ذכר, אך פונאות לציבור הגברים והנשים כאחד.

מבנה הלב ופועולתו

לב הוא איבר חלול שגודלו כגודל האגרוף של בעליין. הוא מצוי במרכז בית החזה, מתחת לצלעות קצהו התחתון פונה מעט שמאליה. משקלו כ- 350 גר', גודלו מעט גדול מאגרוף היד. דפנותיועשויות שריר חזק המסוגל להתקoop ויש בו ארבעה חללים – שניים קטנים הנקראים עליות או פרוזדורים ושניים גדולים הנקראים חדרים. בצד הימני של הלב עלייה אחת (עליה ימנית) וחדר אחד (חדר ימין) וביניהם מסתם. כך גם בצד השמאלי של הלב - עלייה שמאלית וחדר שמאלי וביניהם מסתם. בין החלק הימני לחלק השמאלי מפרידה מחיצה.


אופן פועלות הלב

בצד ימין של הלב נמצא הדם "המשומש" ש חוזר מהגוף וicut הוא "ענ" בחמצן. דם זה יזרם לריאות כדי לחזור את מלאי החמצן שלו. בצד שמאל של הלב נמצא דם שחזור מהריאות. דם זה "מעשר" בחמצן והוא נועד דרך כלי הדם הראשי הנקרא אבי העורקים (האортיה) בחזרה לגוף, כדי לספק חמצן ומזון לכל תא ותא בגופנו, וחוזר חלילה כל חיננו.

פעימות הלב (הדופק) שאתם שמעוים, הן בעצם ההתכווצויות של הלב. בכל פעם שהלב מתכווץ הוא מזרם את הדם אל כל אברי הגוף. על קצב פועלתה של משאבת הלב אחראי מוקד חשמלי פנימי הנמצא בעלייה הימנית השולח בתדריות קבועה, אל כל חלקו הלב, זרים חשמליים הגורמים להתקכווצות הלב ופועלתו. גם הלב עצמו זקוק לאספект דם. כל הדם המביאים דם ללוב עצמו, יוצאים מבית העורקים ונקראים עורקים קטנים או עורקים קורוניים. ישנו שלושה עורקים ראשיים המתפצלים לעורקים קטנים יותר ואלה מתפצלים לרשף ענפה מאוד של נימים בתוך שריר הלב.

היצרות העורקים הכליליים או חסימתם, היא הפוגעת באספект הדם והחמצן לשדרי הלב.

לפניכם תרשים של הלב וכל הדם עם מקרה של שמורות החלקים השונים ותפקידם.



מחלת העורקים הכליליים (הקורונריים)

מחלת העורקים הכליליים נגרמת על ידי טרשת העורקים, שהיא תהליך ממושך של שקיעת שומנים על הדופן הפנימית של העורקים הכליליים. מצב זה יכול לקרות בכל עורק בגוף אך העורקים הכליליים נוטים במיוחד לסבול ממחלה זו.


המשקעים השומניים שוקעים בהדרגה במשך שנים רבות. לעיתים מתחילה התהיליך כבר בגיל צעיר אולם קצב השקיעת המשקעים, שונה מאדם ומואץ אצל אנשים עם גורמי סיכון למחלת לב.

זרימת דם דרך טיפול:

ב מרבית המקרים של תעוקת חזה בלתי יציבה או אוטם שריר הלב, יהיה צורך ב bypass צנטור לב. בדיקה זו הינה פולשנית, מטרתה גילוי הצירויות או חסימות בעורקים הכליליים (העורקים המזינים את הלב), מיקומן המדויק וכן קבלת מדדים נוספים לגבי תפקוד הלב והמסתומים. תוצאת ה bypass משמשת בידי הרופא כדי לקביעת דרך הטיפול עבורך.

אפשרויות הטיפול הינן: א. צנטור טיפול במטרה לפתוח חסימות או הצירויות בעורקים הכליליים וחידוש אספקת הדם. ב. ניתוח מעקפים. ג. טיפול שמרני באמצעות תרופות.

זרימת דם כלילית:



התסמינים למחלת העורקים הכליליים

תעוקת חזה

תעוקת חזה, או בשמה הלועזי – אנגינה פקטורייס, הינה מצב בו מופיעים כאבים בחזה ותחושת אינוחות בזמן מאיץ או התרגשות. התעוקה מתרכשת כאשר העורקים הכליליים המזינים אינם מסוגלים לספק דם מוחמצן בכמות הנדרשת על ידי שריר הלב.

בעת מאיצים גופניים כמו: ריצה, עליית מדרגות, לאחר ארוכה כבדה או במצבי מתח ועצבנות, הלב פועם מהר יותר והוא זקוק ליותר חמצן, ככלו: לאספקת דם גדולה יותר מהעורקים הכליליים. כאשר אין הם מסוגלים לספק את כמות הדם הנדרשת תופיע תעוקת חזה. עם הפסיקת המאמץ הלב יאט את פעולתו והסימנים יחלפו תוך מספר דקות.

כאשר המחלת הטרשתית הולכת ומתקדמת, הכאבים בחזה מופיעים במאיצים קלים יותר ולעתים אף במנוחה. מצב זה נקרא תעוקה לא יציבה.

גורם הסיכון למחלת לב

גורם סיכון להתקפתות של מחלת בעורקי הלב כוללים: הרגלי חיים ותכונות גופ המגבירים את סיכון של האדם לפתח מחלת טרשתית בעורקים כליליים ואוטם שריר הלב. גורמי הסיכון מתחלקים לשתי קבוצות עיקריות: גורמים שאינם ניתנים לשליטה, ולגורמים הנитנים לשליטה, בעיקר על ידי שינוי אורח חיים.

גורם סיכון שאינם ניתנים לשליטה:

♥ **גיל:** עלייה בגיל מהווה גורם סיכון למחלת טרשתית, לרוב מקובל להתייחס אצל גברים מעל גיל 55 ואצל נשים מעל גיל 65 כגורם סיכון.

♥ **מין:** נשים נמצאות בסיכון נמוך יותר לחילות במחלת טרשתית, לנראה בזכות האפקט המגן של ההורמון האסטרוגן, אך פער זה משתנה לאחר הפסקת הווסת.

♥ **תורשה:** הופעת מחלת לב בא או גורמי סיכון למחלת, אצל בני משפחה: הורים או אחיהם בגילאים צעירים יחסית (עד גיל 60-50), מעלה את הסיכון לפתח מחלת טרשתית.

גורם סיכון הנитנים לשליטה:

♥ **יתר לחץ דם** מושקף את עצמת הדם הדוחף אותו נגד דפנות כלי הדם. יתר לחץ דם פוגע בדפנות הפנימיות של העורקים המספקים דם לב ולאיירים אחרים ומקשה על עבודות הלב.

אייזון טוב של לחץ הדם לערכיים הרצויים כפי שקבעו ע"י - הרופא המטפל והקרדיולוג חיווניים לאחר אירוע לבבי. הטיפול ביתר לחץ דם הוא בעיקר תרופתי אך פעילות גופנית, ירידה במשקל ותזונה דלת מלח משלימות את הטיפול התרופטי. יש לעקוב אחר ערכי לחץ הדם לאחר התחלת הטיפול ולודאו כי אכן מאזן בהתאם ליעדים שקבעו הרופאים.

♥ **סכנת**

סכנת הינה גורם סיכון ממשמעותי מאי למחלת כלי הדם הכליליים. אצל החולמים בסוכרת קיימת בעיה ביצור אינסולין, או בשימוש בו, לפירוק הסוכר בדם. כתוצאה לכך רמת הסוכר בדם עולה באופן ממשמעותי, עלייה זו גורמת לפגיעה בדפנות הפנימיות של כלי הדם ומאייצה את התהיליך הטרשתית.

♥ **עישון**

מעבר לנזק ישיר לרקמת הריאה והגברת הסיכון לסרטן ריאות, העישון גורם להאצה של טרשת העורקים, על ידי נזק לרקמת האנדותל (הדופן הפנימית) של כלי הדם. גורם לסיכון מוגבר לייצור תסחיפים, טרשת עורקים. כ- 30% מההתחלואה של מחלות לב מיוחסת לעישון. מתחת לגיל 40 הסיכון להתקף לב, גדל פי 5 בקרוב מעשנים לעומת לא מעשנים. התקפי לב חוזרים- שכיחים יותר בקרוב חול ללב שימושיים לעשן. הפסקת עישון מוחלטת היא חיונית. וחשוב להיעזר בסדניות הגמilia מעישון אשר מציעות כיום ע"י כל קופות החולמים.

♥ רמת כולסטרול גבוהה בדם (היפרליפידמיה)

הcolesterol הוא חומר שומני חיוני לגופנו ותפקידו רבים. עם זאת רמה גבוהה שלコレsterol בדם גורמת להצטברות שומנים בדפנות העורקים והציריות בכלי הדם בלבד, במוח ובכלי דם אחרים בגוף. הטיפול בשומנים הוא תרופתי כאשר שינוי תזונה משלימים טיפול זה.

♥ משקל יתר

משקל יתר והשמנה מהווים גורמי סיכון משמעותיים למחלת טרשתית. נמצא קשר ברור בין השמנת יתר לבין התפתחות סוכרת, יתר שומנים בדם ויתר לחץ דם, ככל מוצבים המעידים את הסיכון לחЛОות במחלת טרשתית.

♥ חוסר פעילות גופנית

חסור פעילות גופנית קבועה, מפחית את יעילות פעולת הלב והריאות. מטופלים לאחר אוטם אשר מקפידים על פעילות גופנית מפחיתם את הסיכון העתידי לאירוע לב נוסף ואף מארכיבים את חייהם. קיים קשר מובהק בין פעילות גופנית מוסדרת, לשיפור יכולת התפקוד הגוף וסיכון לאירועים עתידיים. פעילות גופנית מפחיתה לחץ דם, משפרת סבירות לסתורדים, מעלה "שומן טוב", מפחיתה טריגליקרידים, מורידה את פעילות טסיות הדם, משפרת את איכות החץ, מפחיתה חרדות ופחדים.

♥ מתח וחרדה

רמת גבותות של מתח, כאב ועיניות מעולות את קצב הלב ולchez הדם.

זכוכן ככל שיש לאדם יותר גורמי סיכון שאינם מאזורנים לערכי היעד שנקבעו ע"י הצוות הרפואי, גדל הסיכון העתידי לאירוע לב נוסף. במרבית גורמי הסיכון ניתן היום לטפל ביעילות אך יש להקפיד על מעקב מסודר. יש להתמיד לשמור על השינויים הנדרשים באורחות חיים וכן במרבית הטיפול התרופתי למשך כל החיים! אין להפסיק טיפול ללא הנהיה של הרופאים המטפלים.

דרכי טיפול:

השלב הראשוני בטיפול הינו טיפול רפואי. בחלק מהמקרים של תעוקת חזז בלתי יציבה או אוטם שריר הלב, יהיה צורך ביצוע צנתור לב (אנגיאוגרפיה). בדיקה זו הינה פולשנית, מטרתה גילוי הציריות או חסימות בעורקים הכליליים (העורקים המזינים את הלב), מיקומן המדויק וכן קבלת מדדים נוספים לגבי תפקוד הלב והמסתומים. תוצאה הצנתור משמשת בידי הרופא כליל לקביעת דרך הטיפול עבורך.

במהלך הצנתור אפשרויות הטיפול הינן: א. צנתור רפואי במטרה לפתח חסימות או הציריות בעורקים הכליליים וחידוש אספקת הדם. ב. ניתוח מעקפים. ג. טיפול שמרני באמצעות תרופות.

חזרה לחיה פעילים לאחר צנטור טיפול מתוכנן

השחרור מבית החולים לאחר צנטור רפואי, הינו השלב הבא בתהליך ההחלמה. טבעי כי תחשש מפוחד או רגש יותר מהרגיל. תגבות אלו נועלמות בדרך כלל עם החזרה לשגרה. יומלץ לך על ידי הצוות הרפואי בחלוקת להשתתף בתכנית שיקום, עם שחרור מבית החולים. תכנית זו מאפשרת לך להתאים את פעולותיך לתפקידך לבך תחת השגחה רפואי.

♥ ההנחיות הרשומות מטה הן כלליות ואין מהוות המלצה אישית. לכל מחלים ומחלים קצוב החלמה אישי, רמת העייפות הינה המדד של כל אחד שלבי חזרתו לשגרה.



פעילויות גופניות

ניתן להתחיל בהליכה יומיימם שלושה לאחר השחרור מבית החולים. במידה ולא עסקת בעבר בפעילויות גופניות אירוביית, התחל בהליכה של רביע שעה בבוקר ורביע שעה בערב והעליה בהדרגה את משך וקצב ההליכה. רצוי לילכת חצי שעה עד שעה לפחות פעמיים ביום במהלך ימי השבוע.



מנוחה ושינה

בימים הסמוכים לצנטור הקדש זמן למנוחה.



רחצה

יש להימנע מרחצה במים חמימים מדי, המרחיבים כל דם ועלולים לגרום לירידת לחץ דם ותחושת תשישות. חשוב לרוחץ את מקום הצנטור ללא שפשוף.



הפסיק עישון

חשוב לחדר לעשן - אנו יודעים כי זה קשה אך חיוני לבך. הסיכון למות במטופלים אשר חוזרים לעשן לאחר אוטם שריר הלב הוא גדול ביותר וכן יש להפסיק לחלווטין לעשן. גם עישון

של סיגריות בודדות ביום הוא מסוכן ויש להפסיקו. המלצות הן לשלב את הטיפול התרופתי עם טיפול התנהגותי (בקבוצה או בייעוץ אישי) על מנת להעלות את סיכוי ההצלחה. מומלץ לפנות לסדנה ייودית לגAMILה מעישן הקיימת במסגרת לקופות החוליםים. יש לבקש הפניה לסדנה מרופא משפחה. הסדנה כולל מספר מפגשים עם מומחה וכן שימוש בטיפול רפואי לגAMILה מעישן לפי הצורך.



מאמצים

שבוע הראשון לאחר הצנטור, יש להימנע מפעילויות גופניות הדורשת מאיץ גופני ממשמעותי. לאחר מכן ניתן לחזור לשגרה הקודמת.



חזרה לעבודה

הנр זכאי לשבוע ימים חופשת מחלת אם הנר עוסק בעבודה משרדיות, ועד שבועיים אם הנר עוסק בעבודת כפ"ם.



טיסות וטווולים

חברות הביטוח מאשרות טיסה רק 6 חודשים לאחר צנטור לב. מבחינה רפואית התוויה משתנה בהתאם למצב המטופל – בחודש הראשון יש להימנע מטיסה ולאחר מכן, על פי המלצת הרופא המטפל.



פעילות מינית

ניתן לשוב ולקיים יחסי מין 3 ימים לאחר צנטור, או בהתאם להנחיות הרופא המטפל.

תזונה



لتזונה ישנה השפעה על בריאות הלב, לאربעה מגורמי הסיכון העיקריים למחלת לב כליות יש קשר לתזונה:

יתר לחץ דם, ערבי שומנים גבוהים בדם, סוכרת והשמנה.

מזונות בערך תזונתי גבוה מכילים ייטמינים, מינרלים, סיבים תזונתיים וחומרי תזונה נוספים המסייעים במניעת תחלואה.

כדי לקבל מהמזון את כל המרבי מומלץ לאכול:

- ירקות, פירות, דגנים מלאים, קטניות.

- שומנים טובים - שמן זית, שמן קנולה, אגוזים, אבוקדו, טחינה.

- דגים המכילים את חומצת השומן אומגה 3 בכמות של לפחות שתי מנות בשבוע.

- מוצר חלב דלי שומן.

- אפשר לאכול בשר הודי ועוף בכמות מתונה, ומעט מאוד בשר בקר רזה.

- ביצים - 3 בשבוע.

- שתייה קלה: מים; שתייה חממה: תה יrox.

- קפה: אפשר לשות 3 כפיאות ליום (לא בכוס אחת), מכל סוג.

- להרחב את השימוש בתבלינים ועשבי תיבול.

להימנע: מאכילת מוצרים המכילים שומן טרנס ושומן צמחי מוקשה (בורקס, קראקר, קרואטן, ג'חנון, צ'יפס וכו').

להימנע משתית מתקאות ממוחזקים בסוכר, כולל מים בטעמיים.

להפחית צריכה מלח.

ישום המלצות דורש ייעוץ מקצועי (ניתן לפנות לדיאטנית בקהילה)



טיפול רפואי

קובצת התרופות הרשומה מטה מס'ית למניעת התקדמות המחלת והופעת אירועי לב חזירים. יש ליטול את התרופות לפי הוראת הקרדיוולוג או הרופא המטפל. רצוי לשאול את הרופא המטפל האם אtam מטופלים בנציג אחד מכל סוג תרופות הרשומות מטה. ישנה חשיבות גבוהה לנטיילת של 2 תרופות ("מדליי דם") למניעת הצמדות טסיות. תרופות אלו מונעות היוצרות קריש דם ובכך מונעות חסימה חוזרת של העורק בו מקום התומך (הסתנט) שעלולה להוביל לאירוע לבבי.

לאחר צנטור לב טיפול הנר משוחרר עם התרופות הבאות:

אספרין: תפקיך התרופה הוא למניעת היצמדות טסיות הדם ומונעת יצירת קריש.

אופן הנטילה: פעם ביום בבלילה לאחר ארוחה. יש להימנע מנטיילת התרופה לפני השינה. בדרך כלל מומלצת נטילה לכל החיים.

- לעיתים נדרש ליטול תרופות נוספות לדילול הדם, כגון נוגדי קרישם במצבים אלו ניתן האספרין לתקופה קצרה בלבד.

תרופה נוספת המונעת הצמדות טסיות:

על פי הנקודות והשיקול הרפואי ניתן לך אחת מתוך 3 התרופות הבאות ביחד עם האספירין:

- (1) **קלופידוגרל** – פלייקס, קלוד
- (2) **פרטוגרל** – אפיאנט
- (3) **טיקגרולור** – ברילנטה

אופן נטילה: פלייקס ואפיאנט ניתנות אחת לימה ויש ליטול בשילוב עם אספירין בבליעה לאחר הארוחה, למשך הזמן שנקבע ע"י הרופא המטפל. ברילנטה ניתנת פעמיים ביום.

חשוב: יש להקפיד על נטילת התרופות ואין להפסיק ללא הוראת הקרדיוולג המטפל

- יש לשקול ביצוע ספירתם דם חדש לאחר השחרור מבית החולמים, בהנחהית הרופא המטפל.
 - במקרה של שタン דמי, צואה דמית או שחורה, פריחה, שינוי בתמונהם הדם יש לפנות לרופא המטפל. לעיתים תידרש לבצע בדיקת תפוקדי כלויות כעבור 10 – 7 ימים לאחר הצנתור, לפי הנחיות הרופא המטפל.
 - יש לדוח על נטילת התרופה במידה ונדרשת התערבות חודרנית כגון: בדיקות חודרניות, טיפול רפואי שיניים וכו'.
- בכל** מקרה אין להפסיק את נטילת התרופות הנ"ל ללא קבלת אישור מהקרדיולוג המטפל.

סטטינים: תפקיך התרופה הוא הפחתת רמת הכלוסטרול (בעיקר ה"רע") בדם, סיוע בהאטת התהילן הטרשתי והקטנת שכיחות אירועי לב עתידיים.

ערך המטרה המומלץ של הכלוסטרול "הרע" – LDL הוא מתחת 55 מ"ג/ד"ל, ויתכן אף גמוך מכך במצבים מסוימים.

אופן הנטילה: בבליעה פעם ביום לפני השינה.

(סימבוסטין, סימבוקר, ליפידיל, פרבליפ, ליפיטור, אטורוסטטין, קרסטור, סטאטור) חשוב להציג כי התרופות המומלצות לרוב מבין אלו הין אטורוסטטין, ליפיטור, קרסטור במינונים הגבוהים יותר על מנת ולהשיג את האפקט המagan המרבי.

• בהגיע לרופא המשפחה, שוחח אותו על הטיפול התרופתי בשאר גורמי הסיכון למחלות לב, לדוגמא: עודף שומנים בדם ו/או יתר לחץ דם ו/או סכרים. במידה והן מטופל בתרופות אלו, המשך לקחתן לפי הוראת הרופא המטפל.

עדקה ראשונה



אם הנכם חשים כאב או לחץ המזיכרים את הסימנים אשר הרגשותם לפני הגיעם לבית החולים, הפסיקו כל פעילות אשר אתם עושים ופנו לעזרה רפואי. אם הכאב לא חלף לאחר מספר דקות התקשרו מיידית למקום החירום של מגן דוד אדום 101 או למקום החירום הפרטישאותם קשורים אליו.


בהתאם להנחייתם לשקלן נטילת שלושה כדורי אספירין בלבד (סה"כ 300 מ"ג).

זכרו: מומלץ לא לבוא לבית החולים ברכב פרטי, ובטע שלא לנוהג בעצמכם מהסכמה של אבדן הכרה או החמרה של האירוע. יש להגיע באמבולנס, היוט שעולים להופיע סיבוכים רפואיים. בעת פניה לבית החולים DAGO להביא תרשימים אק"ג,

תופעות המחייבות יצירת קשר עם המחלקה

אם לאחר הצנטור מופיעים אחד או יותר מהתסמינים הבאים:

- נפיחות גדולה או גדלה באופן חריגי במפשעה / או בשורש כף היד.
- כאבים מתמשכים באזורי הצנטור: מפשעה או שורש כף היד.
- הפרשה מתמשכת ממוקם הצנטור או חום לאחר הצנטור.



מעקב רפואי

חשוב מאד לבדוק על ידי קרדיוולוג מסויר שבועות לאחר השחרור מבית החולים. ניתן להתייעץ עם רופא המשפחה אשר לדרכו לעשות זאת. עם שחרורך תקבל את הממסמכים הבאים: מכתב שחזור, דוח צנטור, דוח אקו ותרשים אק"ג. צלם ומסור עותק אחד לרופא המשפחה, עותק אחד יישאר בידייך ועותק שלישי תמסור בהגיעך לביקורת אצל הקרדיוולוג.



טיפול לב

מטופלים לאחר אוטם שריר הלב או צנטור התערבותי (הכנסת תומך "סטנט") או ניפוח בלון זכאים להשתתף בתוכנית שיקום לב ללא עלות. התוכנית כוללת פעילות גופנית תחת השגחת רופא ואחות בהתאם לתוכנית אישית, אשר נקבעת על ידי רופא שיקום לב ומומחה ספורט (פייזיולוג של המאמץ). הפעולות מתקיימות פעמיים בשבוע במשך שעה במכון שיקום הלב הפזרים ברחבי הארץ. התוכנית כוללת ייעוץ תזונתי, ייעוץ רגשי ומעקב רפואי לחולי לב.

כיום ניתן לבצע גם פעילות של שיקום הלב בקלות מהבית באמצעות טיפול מרוחק. התוכנית מיועדת למשתקים בדרגת סיכון נמוכה, שעברו הערכה רפואיית ואישור רופא קרדיוולוג של מכון השיקום.

צוות רב מקצועי בשילוב טכנולוגיה מתקדמת יסייע לכם לבצע שיקום ואיומים מותאמים אישית בביתכם ללא צורך בהגעה לבית החולים. לצורך כך יש להציג-ID בטפון חכם או במחשב שלך (טאבלט). לקבלת מידע על תוכנית השיקום יש לפנות לצוות המחלקה הקרדיוולוגית ו/או לקופה המבטחת.

פגשי הדרכה

יש חשיבות לקבלת מידע מהצוות הרפואי / או הסיעודי על הטיפול בעברת, הגורמים במהלך ודרכי מניעה. פנה לצוות לבירר היכן וכי怎 ניתן לקבל מידע זה.

